



YAG-laser Behandling af akut glaucom.

De/du er blevet behandlet med laser hos Midtjyske Øjenklinik for at forebygge fremtidige tilfælde af akut glaucom (lukketvinklet glaucom).

Laseren afsætter energi i øjet med henblik på at lave et lille hul/spalte i regnbuehinden, dette er den ønskede effekt.

Der kan tilkomme regnbuehindebetændelse (iridocyclitis/irit) i tilslutning til behandlingen. Symptomerne herpå er sløret syn, rødme i det hvide i øjet tæt på hornhinden og eventuelt ømhed/smerter i det behandlede øje. Det vil som regel indtræffe inden for de første 3-6 dage efter behandlingen. Skulle det ske kontakt da klinikken snarest, i weekenden kontaktes vagtlæge mhp akut øjenlæge vurdering.

Da der har været brugt en kontaktlinse i forbindelse med indgrebet, kan der komme en lille ridse i hornhinden. Der vil i så fald komme smerter/ømhed i øjet i løbet af de første timer/døgn efter behandlingen som regel af "skærende" karakter. De forsvinder i løbet af 24 timer, gør de ikke det kontaktes klinikken snarest.

Der skulle gerne være aftalt kontrol ca. 1 uge efter behandling med henblik på kontrol for komplikationer og ønsket effekt. Fremtidige kontroller vil blive aftalt herfra.

Midtjyske Øjenklinik
v/Jens Aagaard
øjelæge.