



## YAG-laser. Behandling af efterstær.

De/du har fået behandlet efterstær med laser hos Midtjyske Øjenklinik.

Behandlingen medfører nogle enkelte ricici som du skal være opmærksom på.

Laseren afsætter energi inde i øjet med henblik på spaltning af efterstæren, det er den ønskede effekt.

Der kan, i sjældne tilfælde, optræde nethindeløsning i timerne (ekstremt sjældent) /dagene efter:

Symptomerne herpå er talrige ”fluer” for det behandlede øje, eventuelt ledsaget af lynglimt og muligvis også af en mere fast skygge i synsfeltet. Denne sidste kan brede sig og kan dannes alle steder, altså både opad og nedad til, eller til højre eller venstre. Skulle dette optræde bedes du snarest kontakte klinikken.

Der kan optræde regnbuehindebetændelse i timerne/dagene efter:

Her er symptomerne diffus synsløring, rødme af det hvide i øjet først inde omkring hornhinden eventuelt bredende sig. Der vil kunne komme ømhed/smerter i øjet. Skulle dette optræde bedes du snarest kontakte klinikken.

Hvis der har været brugt kontaktlinse (øjenlægen brugte en linse til at styre laserstrålerne) i forbindelse med indgrebet, kan der i sjældne tilfælde komme en lille ridse i hornhinden. Symptomerne er ømhed/smerter føles ”skærende” i timerne efter indgrebet, går over uden behandling til næste dag. Skulle det sidste IKKE være tilfældet kontaktes klinikken snarest.

Der skulle gerne være aftalt kontrol tid i klinikken, 1-2 uger efter behandlingen, med henblik på kontrol af såvel effekt som komplikationer.

Midtjyske Øjenklinik  
v/Jens Aagaard  
Øjenlæge.

Jens Aagaard  
Vejlevej 1  
7400 Herning  
Tlf. 96266290  
[www.midtjyskeoejenklinik.dk](http://www.midtjyskeoejenklinik.dk)  
Ydernr. 97128