



SLT-laser Behandling af åbenvinklet glaucom.

De/du er blevet behandlet med SLT-laser hos Midtjyske Øjenklinik.

Behandlingen medfører at der ved hjælp af SLT-laseren afsættes energi i kammervinklen med henblik på at fremme afløbet af væsken i det indre øje. Dette er den ønskede effekt.

Der kan optræde regnbuehinde betændelse (iridocyclitis/irit) efterfølgende. Symptomerne er sløret syn, rødme af det hvide i øjet omkring hornhinden og eventuelt smerter/ømhed af "skærende karakter" i øjet. Vil som regel først dukke op efter 1-4 døgn. Skulle det ske kontakt klinikken snarest.

Der kan i nogle tilfælde optræde ømhed i det behandlede øje om aftenen på behandlingsdagen. Tag i givet fald 2 stk. Panodil 500 mg.

Da der har været brugt en kontaktlinse i forbindelse med indgrebet kan der være kommet en ridse i hornhinden. Symptomerne er ømhed/smerter i øjet, de dukker op i løbet af det første døgn efter indgrebet. Går som regel over i løbet af 1 døgn, skulle de være ved kontakt da klinikken snarest.

Der kan i sjældne tilfælde opstå en slags akut glaucom med meget høje tryk i det indre øje efterfølgende. Symptomerne vil ligne dem for regnbuehinde betændelse men smerterne vil være mere diffuse og måske endda omfatte egentlig hovedpine og kvalme. Skulle det ske kommer det som regel inden for 1-2 dage. Kontakt hurtigst muligt klinikken, i weekend kontakt vagtlæge med henblik på akut øjenlæge tilsyn.

Der skulle gerne være aftalt kontrol tid ca. 1 uge og ca. 2 måneder efter behandlingen, dette for at kontrollere behandlings effekt og mulige komplikationer.

Midtjyske Øjenklinik
v/Jens Aagaard
Øjenlæge

Jens Aagaard
Vejlevej 1
7400 Herning
Tlf. 96266290
www.midtjyskeoejenklinik.dk
Ydernr. 97128